

Patientennahme: _____.

Behandlung einer Analfissur mit Botulinumtoxin

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

bei Ihnen wurde **eine Analfissur** festgestellt. Es handelt sich hierbei **um einen Einriss der Haut im Bereich des Analkanals**. Durch den Schmerz und die Entzündung kommt es zu einer Verkrampfung des Schließmuskels, dies wiederum verhindert die Abheilung der Fissur. Im ersten Schritt werden entzündungshemmende und auch schmerzstillende Salben eingesetzt. Kommt es hierdurch nicht zur Abheilung, wird eine Operation durchgeführt. Bei dieser Maßnahme wird der innere Schließmuskel durchtrennt, um die Schließmuskelverkrampfung zu beseitigen, sodass die Fissur abheilen kann. Unter Umständen wird auch ein Herausschneiden der Fissur (Fissurektomie) durchgeführt.

Alternativ kann **eine Injektion von Botulinumtoxin** in den **Schließmuskel** erfolgen. Botulinumtoxin führt dazu, dass die Muskulatur für einige Wochen geschwächt wird. In dieser Zeit **einer leichten Muskellähmung kann die Fissur abheilen**.

Wir injizieren nur eine geringe Menge, sodass in der Regel die Restkraft des Muskels ausreicht, um eine Stuhlinkontinenz zu sichern.

In weniger Fällen (kleiner als 5 %) kommt es jedoch zu einer vorübergehenden, **leichtgradigen Inkontinenz**. Bei den bisher behandelten Patienten dauerte diese maximal **2 Wochen an und war auf eine Inkontinenz für flüssigen Stuhl beschränkt**.

Systemische Nebenwirkungen sind bei der geringen Dosis unwahrscheinlich. Einflüsse auf die innere Organe sind nicht zu erwarten.

Hiermit betätige ich, dass ich über die Therapie mit Botulinumtoxin ausführlich aufgeklärt wurde.

Ich wurde darüber informiert, dass Botulinumtoxin für diese Indikation nicht zugelassen ist. Ich habe keine weiteren Fragen.

Ort, Datum

Patient _____

Arzt: Dr. med. E. Boschmann

In der ästhetischen Medizin wird pro Muskel normalerweise eine Dosierung von 3-7 E Botox verwendet. Ernsthaftes gesundheitliches Gefährdungspotential besteht ab ca 1000 E. Daher liegt die zulässige Höchstmenge pro Behandlung bei 400 E Botox.

Bei der Fissurtherapie angewandte Dosis liegt pro Behandlung bei ca. 10-20 E!!!! (E-bedeutet Einheiten)